

肺がん術後連携パス（ユーエフティ連携パス）（開始～5ヶ月後）基幹病院・かかりつけ医共用

【患者情報】			
患者名		（ID： ）	
性別	生年月日	年	月 日
	治療開始日	2週間後	4週間後
施設	中央病院	中央病院	中央病院
受診日	/	/	/
診察			
症状	悪心・嘔吐・食欲不振		
	体重減少		
	全身倦怠感		
	下痢		
	口内炎		
	におい・味の違い		
	発疹		
	色素沈着		
	咳・呼吸困難		
	疼痛		
	その他		
血液・ 画像検査	白血球		
	好中球		
	血小板		
	AST		
	ALT		
	総ビリルビン		
	クレアチン		
	腫瘍マーカー	CEA	
	画像検査	胸部 X 線	胸部 X 線
	UFT1日 投与量 (mg)		
UFT 服薬状況	1日		
	朝 昼 夜		
UFT 服薬状況	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開
	月日	/	/
チェック	UFT 残薬チェック		
	併用薬チェック		
処方		UFT 2週処方	UFT 4週処方
達成目標	がんの再発がない		
	UFT 休薬基準に該当する副作用がない		
	UFT 服用ができています		
バリエーション	がんの再発		
	薬の飲み忘れ		
	休薬基準に該当する副作用の症状		
	休薬基準に該当する検査値の異常		



肺がん術後連携パス（ユーエフティ連携パス）（6～12ヶ月後）基幹病院・かかりつけ医共用

		6ヶ月後		7ヶ月後	8ヶ月後
施設		かかりつけ医	中央病院	かかりつけ医	かかりつけ医
受診日		/	/	/	/
診察					
症状	悪心・嘔吐・食欲不振				
	体重減少				
	全身倦怠感				
	下痢				
	口内炎				
	におい・味の違い				
	発疹				
	色素沈着				
	咳・呼吸困難				
	疼痛				
血液・ 画像検査	その他				
	白血球				
	好中球				
	血小板				
	AST				
	ALT				
	総ビリルビン				
	クレアチン				
	腫瘍マーカー	CEA			
	画像検査	胸部 X 線	胸部・腹部 CT + 頭部 MRI		
UFT1 日 投与量 (mg)	1 日				
	朝				
	昼				
	夜				
UFT 服薬状況	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開
	月日	/	/	/	/
チェック	UFT 残薬チェック				
	併用薬チェック				
処方		UFT1 ヶ月処方		UFT1 ヶ月処方	UFT1 ヶ月処方
達成目標	がんの再発がない				
	UFT 休薬基準に該当する副作用がない				
	UFT 服用ができています				
バリエーション	がんの再発				
	薬の飲み忘れ				
	休薬基準に該当する副作用の症状				
	休薬基準に該当する検査値の異常				



肺がん術後連携パス（ユーエフティ連携パス）（13～19ヶ月後）基幹病院・かかりつけ医共用

		13ヶ月後	14ヶ月後	15ヶ月後
施設		かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
受診日		/	/	/
診察				
症状	悪心・嘔吐・食欲不振			
	体重減少			
	全身倦怠感			
	下痢			
	口内炎			
	におい・味の違い			
	発疹			
	色素沈着			
	咳・呼吸困難			
	疼痛			
	その他			
血液・ 画像検査	白血球			
	好中球			
	血小板			
	AST			
	ALT			
	総ビリルビン			
	クレアチン			
	腫瘍マーカー			
	画像検査			胸部 X 線
UFT1日 投与量 (mg)	1日			
	朝			
	昼			
	夜			
UFT 服薬状況	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開
	月日	/	/	/
チェック	UFT 残薬チェック			
	併用薬チェック			
処方		UFT1ヶ月処方	UFT1ヶ月処方	UFT1ヶ月処方
達成目標	がんの再発がない			
	UFT 休薬基準に該当する副作用がない			
	UFT 服用ができています			
バリエーション	がんの再発			
	薬の飲み忘れ			
	休薬基準に該当する副作用の症状			
	休薬基準に該当する検査値の異常			



肺がん術後連携パス（ユーエフティ連携パス）（20～24ヶ月後）基幹病院・かかりつけ医共用

		20ヶ月後	21ヶ月後	22ヶ月後
施設		かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
受診日		/	/	/
診察				
症状	悪心・嘔吐・食欲不振			
	体重減少			
	全身倦怠感			
	下痢			
	口内炎			
	におい・味の違い			
	発疹			
	色素沈着			
	咳・呼吸困難			
	疼痛			
	その他			
血液・ 画像検査	白血球			
	好中球			
	血小板			
	AST			
	ALT			
	総ビリルビン			
	クレアチン			
	腫瘍マーカー		CEA	
	画像検査		胸部 X 線	
UFT1日 投与量 (mg)	1日			
	朝			
	昼			
	夜			
UFT 服薬状況	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開	減量・休薬・再開
	月日	/	/	/
チェック	UFT 残薬チェック			
	併用薬チェック			
処方		UFT1ヶ月処方	UFT1ヶ月処方	UFT1ヶ月処方
達成目標	がんの再発がない			
	UFT 休薬基準に該当する副作用がない			
	UFT 服用ができています			
バリエーション	がんの再発			
	薬の飲み忘れ			
	休薬基準に該当する副作用の症状			
	休薬基準に該当する検査値の異常			

