

胃がん術後連携パス

【ティーエスワン連携パス】

(基幹病院・かかりつけ医共用)

胃がん術後連携パス（術後～6ヶ月）

氏名 _____ I D _____ は必須項目

コース名		1コース				2コース			
施設		中央病院	中央病院			かかりつけ医	かかりつけ医		中央病院
診察・検査	受診日	/	/			/	/		/
	診察								
	血液検査								
	腫瘍マーカー検査								
	画像検査						腹部エコー 胸部X P		C T
チェック項目	身体症状								
	腫瘍マーカー異常								
	画像検査異常								
	休薬基準	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()			全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()		
休薬・減量の有無	休薬・減量	休薬・減量			休薬・減量	休薬・減量			
服用期間	服用開始日	服用終了日	休薬開始日	休薬終了日	休薬開始日	休薬終了日	休薬開始日	休薬終了日	
日時 (/)	/	/	/	/	/	/	/	/	
補助化学療法薬 1日投与量	ティーエスワン ()mg	ティーエスワン ()mg	2週間の休薬 期間です。		ティーエスワン ()mg	ティーエスワン ()mg	2週間の休薬 期間です。		
チェック処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方			残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方			
自覚症状	腹部のチェック/抗がん剤の副作用								
	体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
	腹痛								
	腹部膨満								
	胸焼け								
	下痢								
	嘔気・嘔吐								
	全身倦怠感								
	めまい・冷汗								
	色素沈着								
その他									



患者さんへの説明後、
チェックして下さい。



連携・連絡
(退院時まで)

術後連携の説明
手術後後遺症・再発等
発生時の連絡先

患者さん用パス説明
確認の実施

3 コース				4 コース				
中央病院	かかりつけ医			かかりつけ医	かかりつけ医			中央病院
/	/			/	/			/
					腹部エコー 胸部X P			C T
全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()			全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()			
休薬・減量	休薬・減量			休薬・減量	休薬・減量			
服用開始日	服用終了日	休薬 開始日	休薬 終了日	休薬開始日	休薬終了日	休薬 開始日	休薬 終了日	
/	/	/	/	/	/	/	/	
ティーエスワン () mg	ティーエスワン () mg	2週間の休薬 期間です。		ティーエスワン () mg	ティーエスワン () mg	2週間の休薬 期間です。		
残薬チェック 併用薬チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬チェック TS-1 2週間処方			残薬チェック 併用薬チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬チェック TS-1 2週間処方			
kg	kg	kg		kg	kg	kg		kg



胃がん術後連携パス（6ヶ月～1年）

は必須項目

コース名		5コース				6コース			
施設		中央病院	かかりつけ医			かかりつけ医	かかりつけ医		中央病院
診察・検査	受診日	/	/			/	/		/
	診察								
	血液検査								
	腫瘍マーカー検査								
	画像検査						腹部エコー 胸部X P		C T
チェック項目	身体症状								
	腫瘍マーカー異常								
	画像検査異常								
	休薬基準	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()			全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()		
休薬・減量の有無	休薬・減量	休薬・減量			休薬・減量	休薬・減量			
服用期間	服用開始日	服用終了日	休薬開始日	休薬終了日	休薬開始日	休薬終了日	休薬開始日	休薬終了日	
日時 (/)	/	/	/	/	/	/	/	/	
補助化学療法薬 1日投与量	ティーエスワン ()mg	ティーエスワン ()mg	2週間の休薬 期間です。		ティーエスワン ()mg	ティーエスワン ()mg	2週間の休薬 期間です。		
チェック処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方			残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方			
自覚症状	体重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	
	腹痛								
	腹部膨満								
	胸焼け								
	下痢								
	嘔気・嘔吐								
	全身倦怠感								
	めまい・冷汗								
	色素沈着								
	その他								



7コース				8コース				
中央病院	かかりつけ医			かかりつけ医	かかりつけ医			中央病院
/	/			/	/			/
					腹部エコー 胸部X P			CT
全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()			全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()	全身状態 (PS) 白血球減少 血小板減少 肝機能 クレアチニン その他 ()			
休薬・減量	休薬・減量			休薬・減量	休薬・減量			
服用開始日	服用終了日	休薬 開始日	休薬 終了日	休薬開始日	休薬終了日	休薬 開始日	休薬 終了日	
/	/	/	/	/	/	/	/	
ティーエスワン () mg	ティーエスワン () mg	2週間の休薬 期間です。		ティーエスワン () mg	ティーエスワン () mg	2週間の休薬 期間です。		
残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方			残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方	残薬チェック 併用薬 チェック TS-1 2週間処方			
kg	kg	kg		kg	kg	kg		kg



胃がん術後連携パス（1年3ヶ月～2年）

は必須項目

術後		1年3ヶ月	
施設		かかりつけ医	
診察・検査 スケジュール	受診日	/	
	診察		
	血液検査（腫瘍マーカー含む）		
	画像検査	腹部エコー・胸部X P	
教育・指導	生活指導		
診察	腸閉塞症状	なし あり（ ）	
	ダンピング症候群	なし あり（ ）	
	食道逆流症状	なし あり（ ）	
	貧血症状	なし あり（ ）	
	狭窄	なし あり（ ）	
	小胃症状	なし あり（ ）	
	その他の異常	なし あり（ ）	
血液・画像検査	貧血（RBC・Hb）	なし あり（ ）	
	炎症所見（WBC・CRP）	なし あり（ ）	
	肝機能異常 （AST・ALT・Alp・Tbil・LDH）	なし あり（ ）	
	腎機能異常（Cr・BUN）	なし あり（ ）	
	腫瘍マーカー異常（CEA・CA19-9）	なし あり（ ）	
	画像検査異常	なし あり（ ）	
自覚症状	腹部	体重	k g
		腹痛	
		腹部膨満	
		胸やけ	
		下痢	
	その他	吐き気・嘔吐	
		全身倦怠感	
		めまい・冷汗	
	その他		



胃がん術後連携パス（2年3ヶ月～3年）

は必須項目

術後		2年3ヶ月	
施設		かかりつけ医	
診察・検査 スケジュール	受診日	/	
	診察		
	血液検査（腫瘍マーカー含む）		
	画像検査	腹部エコー・胸部X P	
教育・指導	生活指導		
診察	腸閉塞症状	なし あり（ ）	
	ダンピング症候群	なし あり（ ）	
	食道逆流症状	なし あり（ ）	
	貧血症状	なし あり（ ）	
	狭窄	なし あり（ ）	
	小胃症状	なし あり（ ）	
	その他の異常	なし あり（ ）	
血液・画像検査	貧血（RBC・Hb）	なし あり（ ）	
	炎症所見（WBC・CRP）	なし あり（ ）	
	肝機能異常 （AST・ALT・Alp・Tbil・LDH）	なし あり（ ）	
	腎機能異常（Cr・BUN）	なし あり（ ）	
	腫瘍マーカー異常（CEA・CA19-9）	なし あり（ ）	
	画像検査異常	なし あり（ ）	
自覚症状	腹部	体重	k g
		腹痛	
		腹部膨満	
		胸やけ	
		下痢	
	その他	吐き気・嘔吐	
		全身倦怠感	
		めまい・冷汗	
	その他		



胃がん術後連携パス（3年3ヶ月～4年）

は必須項目

術後		3年3ヶ月	
施設		かかりつけ医	
診察・検査 スケジュール	受診日	/	
	診察		
	血液検査（腫瘍マーカー含む）		
	画像検査	腹部エコー・胸部X P	
教育・指導	生活指導		
診察	腸閉塞症状	なし あり（ ）	
	ダンピング症候群	なし あり（ ）	
	食道逆流症状	なし あり（ ）	
	貧血症状	なし あり（ ）	
	狭窄	なし あり（ ）	
	小胃症状	なし あり（ ）	
	その他の異常	なし あり（ ）	
血液・画像検査	貧血（RBC・Hb）	なし あり（ ）	
	炎症所見（WBC・CRP）	なし あり（ ）	
	肝機能異常 （AST・ALT・Alp・Tbil・LDH）	なし あり（ ）	
	腎機能異常（Cr・BUN）	なし あり（ ）	
	腫瘍マーカー異常（CEA・CA19-9）	なし あり（ ）	
	画像検査異常	なし あり（ ）	
自覚症状	腹部	体重	k g
		腹痛	
		腹部膨満	
		胸やけ	
		下痢	
	その他	吐き気・嘔吐	
		全身倦怠感	
		めまい・冷汗	
	その他		



胃がん術後連携パス（４年３ヶ月～５年）

は必須項目

術後		４年３ヶ月	
施設		かかりつけ医	
診察・検査 スケジュール	受診日	/	
	診察		
	血液検査（腫瘍マーカー含む）		
	画像検査	腹部エコー・胸部X P	
教育・指導	生活指導		
診察	腸閉塞症状	なし あり（ ）	
	ダンピング症候群	なし あり（ ）	
	食道逆流症状	なし あり（ ）	
	貧血症状	なし あり（ ）	
	狭窄	なし あり（ ）	
	小胃症状	なし あり（ ）	
	その他の異常	なし あり（ ）	
血液・画像検査	貧血（RBC・Hb）	なし あり（ ）	
	炎症所見（WBC・CRP）	なし あり（ ）	
	肝機能異常 （AST・ALT・Alp・Tbil・LDH）	なし あり（ ）	
	腎機能異常（Cr・BUN）	なし あり（ ）	
	腫瘍マーカー異常（CEA・CA19-9）	なし あり（ ）	
	画像検査異常	なし あり（ ）	
自覚症状	腹部	体重	k g
		腹痛	
		腹部膨満	
		胸やけ	
		下痢	
	その他	吐き気・嘔吐	
		全身倦怠感	
		めまい・冷汗	
	その他		



