

大腸がん術後連携パス(ゼロダ連携パス) 基幹病院・かかりつけ医共用

患者情報				
ふりがな				
患者名:	(ID :)	性別:	生年月日: 年 月 日
合併症:				
手術年月日:	年 月 日	術式:		

連携パスの達成目標(術後補助化学療法期間中)		
術後連携によるフォローアップ	術後補助化学療法の完遂	術後合併症、副作用、再発の早期発見
術後補助化学療法開始前の説明と確認		
術後の合併症と対処法について	本治療法について	副作用について

コース名		1コース開始前	2コース開始前	3コース開始前	4コース開始前
受診日		月 日	月 日	月 日	月 日
受診施設		中央病院	中央病院 / かかりつけ医	中央病院 / かかりつけ医	中央病院 / かかりつけ医
投薬・処置		体表面積: 投薬量(錠/回)朝夕	開始曜日・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝夕	開始曜日・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝夕	開始曜日・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝夕
		3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー	3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー	3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー	3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー
バイタル	体温				
	血圧	/	/	/	/
	体重	kg	kg	kg	kg
PS					
食欲不振					
悪心・嘔吐					
下痢		(回/日、性状:)	(回/日、性状:)	(回/日、性状:)	(回/日、性状:)
口内炎					
倦怠感					
色素沈着		部位()	部位()	部位()	部位()
手足症候群		部位()	部位()	部位()	部位()
検査		WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/mm ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10×10 ³ /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満 腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) 胸部X線 or CT 腹部超音波・CT	WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/mm ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10×10 ³ /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満	WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/mm ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10×10 ³ /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満	WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/mm ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10×10 ³ /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満
薬局		服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)	服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)	服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)	服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)
特記事項 申し送り および 注意事項					

基幹病院： 島根県立中央病院

担当医名：

連絡先：TEL 0853 - 22 - 5111

FAX 0853 - 21 - 2975

かかりつけ医：

担当医名：

連絡先：TEL

FAX

5コース開始前	6コース開始前	7コース開始前	8コース開始前
月 日	月 日	月 日	月 日
中央病院 / かかりつけ医	中央病院 / かかりつけ医	中央病院 / かかりつけ医	中央病院 / かかりつけ医
開始遅延・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝・夕	開始遅延・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝・夕	開始遅延・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝・夕	開始遅延・減量・休薬 投薬量(錠/回)朝・夕
3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー	3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー	3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー	3週間オーダー 次回来院時 検査予約オーダー
/	/	/	/
kg	kg	kg	kg
(回/日、性状：)	(回/日、性状：)	(回/日、性状：)	(回/日、性状：)
部位()	部位()	部位()	部位()
部位()	部位()	部位()	部位()
WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/ m m ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10 × 10 /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満 腫瘍マ-カ- (CEA・CA19-9)	WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/ m m ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10 × 10 /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満	WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/ m m ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10 × 10 /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満	WBC 3,000/mm ³ <12,000/mm ³ 好中球 1,500/ m m ³ 以上 Hb 9.0g/dL PLT 10 × 10 /mm ³ T-Bil<1.5mg/dL GOT&GPT<100IU/L Cr<1.5mg/dL未満
服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)	服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)	服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)	服薬指導 副作用説明 併用薬の確認 (相互作用等)