

サイラムザ+Weekly パクリタキセル

適 応 疾 患 ： 治癒切除不能な進行胃癌・治癒切除不能な再発胃癌

1 コースの期間 ： 4 週間

上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	レスタミンコーワ錠	5錠 (50mg)	内服	day1、15: サイラムザ投与30分前までに day8: パクリタキセル投与30分前までに
3	デキサート注	8.25mg	静注	day1、15: 緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		day8: パクリタキセル投与約30分
4	生食	50mL	点滴静注	30分
5	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	30分～60分
	生食	250mL		
6	生食	100mL	点滴静注	60分 (サイラムザ投与後のブランク、3コース目からは省略可能)
7	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓													
2	↓							↓							↓													
3	↓							↓							↓													
4								↓																				
5	↓														↓													
6	↓														↓													
7	↓							↓							↓													

投与順序 day1、15: 1→2→3→5→6→7 day8: 1→2→3→4→7