

FOLFOXIRI(フルオロウラシル+イリノテカン+オキサリプラチン)+ベバシズマブ(導入療法)

適 応 疾 患 : 大腸がん

1 コースの期間 : 2 週間

上限コース回数 : 12 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	ランソプラゾール	15mg	内服	day1はアプレピタントと同時服用 day2-4は朝食後
3	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メインルート
4	ベバシズマブ 生食	5mg/kg 100mL	点滴静注	30～90分
5	パロノセトロン静注 デキサート注 ブチルスコポラミン注 生食	0.75mg 9.9mg 20mg 50mL	点滴静注	15分
6	イリノテカン 5%ブドウ糖液	165mg/m ² 250mL	点滴静注	60分
7	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	120分 レボホリナートと同時に投与
8	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	120分 オキサリプラチンと同時に投与
9	フルオロウラシル ノボ・ヘパリン注 生食	3200mg/m ² 1mL 必要量	ポンプにて 持続静注	46時間
10	ヘパリンNaロック	100単位/mL 10mL	静注	化学療法終了後
11	デカドロン錠	2～4日目:8mg	内服	朝食後

	day													
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓	↓											
2	↓	↓	↓	↓										
3	↓													
4	↓													
5	↓													
6	↓													
7	↓													
8	↓													
9	←→													
10			↓											
11		↓	↓	↓										

投与順序 1、2→3→4→5→6→7、8→9