

# FOLFOXIRI(フルオロウラシル)+ペバシズマブ(維持療法)

適 応 疾 患 ： 大腸がん

1 コースの期間 ： 2 週間

上限コース回数 ： なし

| Rp. | 薬剤        | 投与量                    | 投与経路  | 投与速度、時間 |
|-----|-----------|------------------------|-------|---------|
| 1   | 生食        | 250mL                  | 点滴静注  | メインルート  |
| 2   | ペバシズマブ    | 5mg/kg                 | 点滴静注  | 30～90分  |
|     | 生食        | 100mL                  |       |         |
| 3   | デキサート注    | 6.6mg                  | 点滴静注  | 15分     |
|     | 生食        | 50mL                   |       |         |
| 4   | レボホリナート   | 200mg/ m <sup>2</sup>  | 点滴静注  | 120分    |
|     | 5%ブドウ糖液   | 250mL                  |       |         |
| 5   | フルオロウラシル  | 3200mg/ m <sup>2</sup> | ポンプにて | 46時間    |
|     | ノボ・ヘパリン注  | 1mL                    | 持続静注  |         |
|     | 生食        | 必要量                    |       |         |
| 6   | ヘパリンNaロック | 100単位/10mL             | 静注    | 化学療法終了後 |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 3   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 4   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 5   | ←→  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 6   |     |   | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

投与順序 1→2→3→4→5