FOLFIRINOX（フルオロウラシル+イリノテカン+オキサリプラチン）

適 応 疾 患 ： 治癒切除不能 膵がん

1コースの期間 ： 14 日間 上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分
	5%ブドウ糖液	250mL		
5	レボホリナート	200mg/㎡	点滴静注	120分 オキサリプラチン終了後に投与開始
	5%ブドウ糖液	250mL		
6	イリノテカン	180mg/㎡	点滴静注	90分 オキサリプラチン終了30分後に開始
	5%ブドウ糖液	250mL		
7	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	10分
	生食	50mL		
8	フルオロウラシル	2400mg/㎡	ポンプにて持続静注	46時間
	ノボ・ヘパリン注	1mL		
	生食	必要量		
9	ヘパリンNaロック	100単位/mL 10mL	静注	化学療法終了後
10	デカドロン錠	2～4日目：4mg	内服	朝食後

	day													
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓	↓											
2	↓													
3	↓													
4	↓													
5	↓													
6	↓													
7	↓													
8	←→													
9			↓											
10		↓	↓	↓										

投与順序 1→2→3→4→5、6→7→8

オキサリプラチン投与終了後、レボホリナートを開始する。レボホリナート開始 30 分後からイリノテカンを投与開始する。