

## アイエーコール(動注)

適 応 疾 患 : 肝細胞がん

1 コースの期間 : 4～6 週間 上限コース回数 : なし

| Rp. | 薬剤          | 投与量                       | 投与経路 | 投与速度、時間                   |
|-----|-------------|---------------------------|------|---------------------------|
| 1   | ソルデム3A      | 500mL×5本                  | 点滴静注 | 250mL/時、アイエーコール3時間前から持続投与 |
| 2   | アプレピタントカプセル | day1:125mg<br>day2、3:80mg | 内服   | 抗がん剤投与60～90分前<br>午前中      |
| 3   | パロノセトロン静注   | 0.75mg                    | 点滴静注 | 15分                       |
|     | デキサート注      | 6.6mg                     |      |                           |
|     | 生食          | 50mL                      |      |                           |
| 4   | アイエーコール     | 100mg                     | 動脈注射 | 20分                       |
|     | 生食          | 100mL                     |      |                           |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ↓   | ↓ | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

投与順序 1→2→3→4