

## サイラムザ

適 応 疾 患 : がん化学療法後増悪した血清AFP値 400ng/mL 以上の切除不能肝細胞癌

1 コースの期間 : 2 週間 上限コース回数 : なし

| Rp. | 薬剤        | 投与量       | 投与経路 | 投与速度、時間        |
|-----|-----------|-----------|------|----------------|
| 1   | 生食        | 250mL     | 点滴静注 | メインルート         |
| 2   | レスタミンコーワ錠 | 5錠 (50mg) | 内服   | サイラムザ投与30分前までに |
| 3   | サイラムザ     | 8mg/kg    | 点滴静注 | 30分～60分        |
|     | 生食        | 250mL     |      |                |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 3   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

投与順序 1→2→3