

イミフィンジ+GC(ゲムシタビン+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 治癒切除不能な胆道癌

1 コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : 8 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	イミフィンジ 生食	1500mg/body 250mL	点滴静注	60分
4	パロノセトロン静注 デキサート注 生食	0.75mg 4.95mg 50mL	点滴静注	15分
5	シスプラチン 生食	25mg/m ² 500mL	点滴静注	60分
6	ゲムシタビン 生食	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	30分
7	ソルデム3A	500mL	点滴静注	60分

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓					↓	↓	↓											
2	↓							↓													
3	↓																				
4	↓							↓													
5	↓							↓													
6	↓							↓													
7	↓							↓													

投与順序 1 日目: 1→2→3→4→5→6→7 8 日目: 1→2→4→5→6→7