

## キイトルーダ+GC(ゲムシタビン+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 切除不能・再発胆道癌

1コースの期間 : 3週間

上限コース回数 : 8コース、9コース目以降はキイトルーダ+ゲムシタビンで継続

| Rp. | 薬剤        | 投与量                   | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|-----|-----------|-----------------------|------|---------|
| 1   | 生食        | 500mL                 | 点滴静注 | メインルート  |
| 2   | キイトルーダ    | 200mg/body            | 点滴静注 | 30分     |
|     | 生食        | 100mL                 |      |         |
| 3   | パロノセトロン静注 | 0.75mg                | 点滴静注 | 15分     |
|     | デキサート注    | 9.9mg                 |      |         |
|     | 生食        | 50mL                  |      |         |
| 4   | シスプラチン注   | 25mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 60分     |
|     | 生食        | 500mL                 |      |         |
| 5   | ゲムシタビン注   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分     |
|     | 生食        | 100mL                 |      |         |
| 6   | ソルデム3A    | 500mL                 | 点滴静注 | 60分     |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

投与順序    day1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6    day8: 1 → 3 → 4 → 5 → 6