

TCH(ドセタキセル+カルボプラチン+トラスツズマブ)

適 応 疾 患 ： HER2 過剰発現の乳がん

1 コースの期間 ： 3 週間

上限コース回数 ： 6 コース(6 コース後はトラスツズマブのみ1年間継続)

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1 : 125mg day2、3 : 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分
	生食	250mL		
4	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	ドセタキセル	60～75mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		
6	カルボプラチン	AUC5～6(300～400mg/m ²)	点滴静注	60 分
	生食	250mL		
7	デカドロン錠	4mg	内服	朝昼食後

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7		↓	↓																		

投与順序 1→2→3→4→5→6