

テセントリク+アブラキサン

適 応 疾 患 : PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

1 コースの期間 : 4 週間                    上限コース回数 : なし

| Rp. | 薬剤     | 投与量                   | 投与経路 | 投与速度、時間           |
|-----|--------|-----------------------|------|-------------------|
| 1   | 生食     | 250mL                 | 点滴静注 | メインルート            |
| 2   | テセントリク | 840mg/body            | 点滴静注 | 初回60分<br>2回目以降30分 |
|     | 生食     | 250mL                 |      |                   |
| 3   | デキサート注 | 6.6mg                 | 点滴静注 | 15分               |
|     | 生食     | 50mL                  |      |                   |
| 4   | アブラキサン | 100mg/ m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分               |
|     | 生食     | 50mL                  |      |                   |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

投与順序 day1、15: 1→2→3→4                    day8: 1→3→4