## キイトルーダ＋ゲムシタビン＋カルボプラチン

適 応 疾 患 ：

PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性（triple-negative）の治癒切除不能又は転移・再発乳癌

1 コースの期間 ： 3 週間　　上限コース回数 ：なし

| Rp. | 薬剤 | 投与量 | 投与経路 | 投与速度、時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アプレピタントカプセル | day1：125mg | 内服 | 抗がん剤投与60～90分前 |
| | | day2、3：80mg | | 午前中 |
| 2 | 生食 | 250mL | 点滴静注 | メインルート |
| 3 | キイトルーダ | 200mg/body | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 100mL | | |
| 4 | グラニセトロン注 | 3mg | 点滴静注 | 15分 |
| | デキサート注 | 4.95mg | | |
| | 生食 | 50mL | | |
| 5 | ゲムシタビン | 1000mg/㎡ | 点滴静注 | 30分 |
| | 生食 | 100mL | | |
| 6 | カルボプラチン | AUC2 | 点滴静注 | 60分 |
| | 生食 | 250mL | | |

| | day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | |
| 2 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

投与順序　day1： 1→2→3→4→5→6　day8： 1→2→4→5→6