

キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン

適 応 疾 患 : ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスク乳癌 (術前補助療法)

1 コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : 4 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	50mg	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
5	デキサート注	8.25mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩徐に静注
	ファモチジン注	20mg		
6	グラニセトロン注	3mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
7	生食	50mL	点滴静注	30分
8	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	250mL		
9	カルボプラチン	AUC5	点滴静注	30分
	生食	250mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓						
4	↓																				
5	↓							↓							↓						
6	↓																				
7								↓							↓						
8	↓							↓							↓						
9	↓																				

投与順序 day1: 1→2→3→4→5→6→8→9 day8、15: 2→3→5→7→8