

キイトルーダ+EC(エピルビシン+エンドキサン)

適 応 疾 患 : ホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性で再発高リスク乳癌 (術前補助療法)

1 コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : 4 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	ソルアセトF メトクロプラミド注	500mL 10mg	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注 デキサート注 生食	0.75mg 9.9mg 50mL	点滴静注	15分
4	キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	点滴静注	30分
5	エピルビシン 生食	90mg/m ² 50mL	点滴静注	10分
6	エンドキサン注 生食	600mg/m ² 250mL	点滴静注	30分
7	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7		↓	↓	↓																	

投与順序 1 → 2、3 → 4 → 5 → 6