シスプラチン＋エトポシド＋イミフィンジ （ショートハイドレーション法）

適 応 疾 患 ： 進展型小細胞肺癌

1コースの期間 ： 3週間　上限コース回数 ： 4コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	生食	250mL/500mL	点滴静注	メインルート
3	イミフィンジ	1500mg/body	点滴静注	60分
	生食	250mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	エトポシド	80～100mg/㎡	点滴静注	90分
	生食	250mL		
6	KCL	10mEq	点滴静注	60分
	硫酸Mg補正液	8mEq		
	ソルデム1	500mL		
7	マンニットール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	75～80mg/㎡	点滴静注	60分
	生食	500mL		
9	KCL	10mEq	点滴静注	60分
	ソルデム1	500mL		
10	デカドロン錠	8mg	内服	朝食後

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓																		
3	↓																				
4	↓																				
5	↓	↓	↓																		
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				
9	↓																				
10		↓	↓	↓																	

投与順序 day1： 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9　day 2、3： 2 → 5