

パクリタキセル + カルボプラチン(放射線同時照射併用)

適 応 疾 患 : 非小細胞肺がん StageⅢA

1 コースの期間 : 6 週間 上限コース回数 : 1 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコウ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注	8.25mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に
	ファモチジン注	20mg		緩徐に静注
5	グラニセトロン注	3mg	点滴静注	30分
	生食	50mL		
6	パクリタキセル	40mg/m ²	点滴静注	90分
	生食	250mL		
7	カルボプラチン	AUC2	点滴静注	90分
	5%ブドウ糖液	250mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓					↓	↓	↓					↓	↓	↓					↓	↓	↓				
2	↓							↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓							↓						
4	↓							↓							↓							↓						
5	↓							↓							↓							↓						
6	↓							↓							↓							↓						
7	↓							↓							↓							↓						

	day													
Rp.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	↓	↓	↓					↓	↓	↓				
2	↓							↓						
3	↓							↓						
4	↓							↓						
5	↓							↓						
6	↓							↓						
7	↓							↓						

投与順序 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7