

DdTC(パクリタキセル+カルボプラチン)+ベバシズマブ

適 応 疾 患 ： 進行、再発卵巣癌

1 コースの期間 ： 3 週間 上限コース回数 ： 5 回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注 ファモチジン注	8.25mg 20mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩徐に静注
5	パロノセトロン静注 生食	0.75mg 50mL	点滴静注	30分
6	生食	50mL	点滴静注	30分
7	パクリタキセル 生食	70～80mg/m ² 250mL	点滴静注	60分
8	カルボプラチン 生食	AUC5～6 250mL	点滴静注	60分
9	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	30-90分

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓						
4	↓							↓							↓						
5	↓																				
6								↓							↓						
7	↓							↓							↓						
8	↓																				
9	↓																				

投与順序

day1:1→2→3→4→5→7→8→9 day8、15:2→3→4→6→7