

Triweekly TC(パクリタキセル+カルボプラチン)+アバステン

適 応 疾 患 : 子宮頸癌再発・進行子宮頸癌

1 コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : 6 回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	レスタミンコーワ錠	5錠 (50mg)	内服	パクリタキセル投与30分前までに
4	デキサート注 ファモチジン注	19.8mg 20mg	静注	パクリタキセル投与約30分前に緩 徐に静注
5	パロノセトロン静注 生食	0.75mg 50mL	点滴静注	30分
6	パクリタキセル 生食	175～180mg/m ² 250mL	点滴静注	180分
7	カルボプラチン 生食	AUC5～6 250mL	点滴静注	60分
8	アバステン 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	30-90分

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				

投与順序 1→2→3→4→5→6→7→8