

GC 療法(ゲムシタビン+シスプラチン)

適 応 疾 患 ： 進行性尿路移行上皮癌

1 コースの期間 ： 4 週間 上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	生食	500mL	点滴静注	メインルート
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
6	ゲムシタビン	1000mg/ m ²	点滴静注	30分
	生食	100mL		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	60分
8	シスプラチン	70mg/ m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
9	デカドロン錠	8mg	内服	朝昼食後

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		↓	↓	↓																								
2	↓							↓							↓													
3		↓																										
4	↓							↓							↓													
5		↓																										
6	↓							↓							↓													
7		↓																										
8		↓																										
9			↓	↓	↓																							

投与順序 Day1,8,15: 2→4→6 Day2: 1→3→5→7→8