

M-VAC療法(メソトレキセート+エクザール+ドキソルビシン+シスプラチン)

適 応 疾 患 ： 移行上皮癌

1 コースの期間 ： 4 週間 上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	生食	500mL	点滴静注	メインルート
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	メソトレキセート	30mg/m ²	点滴静注	60分
	生食	100mL		
6	エクザール	3mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	50mL		アドリアシンと同時投与
7	ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴静注	30分
	生食	100mL		エクザールと同時投与
8	マンニトール注	300mL	点滴静注	60分
9	シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
10	デカドロン錠	8mg	内服	朝昼食後

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1		↓	↓	↓																								
2	↓														↓							↓						
3		↓																										
4		↓																										
5	↓														↓							↓						
6		↓													↓							↓						
7		↓																										
8		↓																										
9		↓																										
10			↓	↓	↓																							

投与順序 Day1: 2→5 Day2:1→3→4→6、7→8→9 Day15、22:2→5→6