

CDDP+ADM(シスプラチン+ドキソルビシン)(放射線療法併用動注化学療法)

適 応 疾 患 ： 膀胱がん

1 コースの期間 ： 4 週間 上限コース回数 ： 4 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	ソルアセトF	500mL	点滴静注	180分
	ファモチジン注	20mg		
	ヒシファーゲン配合静注	20mL		
4	マンニトール注	300mL	点滴静注	60分
5	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
6	シスプラチン	70mg/m ²	動注	30分
7	ドキソルビシン	30mg/m ²	動注	10-20分
	生食	50mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓																											
3	↓																											
4	↓																											
5	↓																											
6	↓																											
7	↓																											

投与順序 1→2→3→4→5→6→7