

BEP 療法(ブレオ+ラステット+シスプラチン)

適 応 疾 患 ： 進行性精巣腫瘍

1 コースの期間 ： 3 週間 上限コース回数 ： 4 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	グラニセトン注 デキサート注 生食	3mg 9.9mg 50mL	点滴静注	15分
5	マンニトール注	300mL	点滴静注	60分
6	シスプラチン 生食	20mg/m ² 500mL	点滴静注	120分
7	エトポシド 生食	100mg/m ² 500mL	点滴静注	60分
8	ブレオ 生食	30mg/body 100mL	点滴静注	60分

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓	↓																
3								↓							↓						
4	↓	↓	↓	↓	↓																
5	↓	↓	↓	↓	↓																
6	↓	↓	↓	↓	↓																
7	↓	↓	↓	↓	↓																
8		↓						↓							↓						

投与順序 Day1、3、4、5: 1→2→4→5→6→7 Day2: 2→4→5→6→7→8 Day8、15: 3→8