

R-B(90)療法（リツキシマブ＋ベンダムスチン）

適応疾患：低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、未治療のマントル細胞リンパ腫

1コースの期間：4週間 最大コース回数：6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤		内服	リツキシマブ投与30分前に内服
	抗ヒスタミン剤			
2	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
3	生食	250mL	点滴静注	メインルート
4	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15分
	デキサート注	3.3mg		
	生食	50mL		
5	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量		
6	ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴静注	10分
	生食	50mL		

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓																											
2	↓	↓	↓																									
3	↓	↓																										
4	↓	↓																										
5	↓																											
6	↓	↓																										

投与順序 day1: 1→2→3→4→5→6 day2: 2→3→4→6