

CHASER 療法(リツキシマブ+エンドキサン+シタラビン+エトポシド+デキサメタゾン)

適 応 疾 患 : CD20 陽性 B 細胞非ホジキンリンパ腫

1 クールの期間 : 3 週間

上限コース回数 : 4 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤		内服	リツキシマブ投与30分前
	抗ヒスタミン剤			
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	リツキシマブ注	375mg/m ²	点滴静注	特記事項参照
	生食	500mL		
4	生食	500mL	点滴静注	メインルート
5	アロキシ注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	39.6mg		
	生食	50mL		
6	エンドキサン注	1200mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
7	デキサート注	39.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
8	シタラビン注	2000mg/m ²	点滴静注	180分
	生食	500mL		
9	エトポシド注	100mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓																				
3	↓																				
4		↓	↓	↓																	
5		↓																			
6		↓																			
7			↓	↓																	
8			↓	↓																	
9		↓	↓	↓																	

投与順序

1 日目: 1 → 2 → 3

2 日目: 4 → 5 → 6 → 9

3、4 日目: 4 → 7 → 8 → 9