

PolaRB 療法(ポライビー+リツキシマブ+ベンダムスチン)

適応疾患：再発・難治性びまん性大細胞型 B リンパ腫

1コースの期間：3週間 上限コース回数：6コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤		内服	リツキシマブ、ポライビー投与30分前
	抗ヒスタミン剤			
2	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
3	生食	250mL/500mL	点滴静注	メインルート
4	グラニセトン注	3mg	点滴静注	15~30分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
5	リツキシマブ注	375mg/m ²	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量		
6	ポライビー注	1.8mg/kg	点滴静注	初回90分 2回目以降30分
	生食	100mL		
	注射用水	必要量		
7	生食	50mL	点滴静注	30分(ポライビー終了後に投与)
8	ベンダムスチン注	90mg/m ²	点滴静注	10分
	生食	50mL		

1コース目

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓																			
2		↓	↓	↓																	
3	↓	↓	↓																		
4		↓	↓																		
5	↓																				
6		↓																			
7		↓																			
8		↓	↓																		

投与順序 1日目:1→3→5 2日目:1→2→3→4→6→7→8 3日目:2→3→4→8

2コース目以降

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓	↓	↓																		
3	↓	↓																			
4	↓	↓																			
5	↓																				
6	↓																				
7																					
8	↓	↓																			

投与順序 1日目:1→2→3→4→5→6→8 2日目:2→3→4→8