

エプキンリ

適 応 疾 患 ： 再発・難治性の大細胞型 B 細胞リンパ腫及び濾胞性リンパ腫

1 コースの期間 ： 4 週間 上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール	1000mg	内服	エプキンリ投与30～120分前に
	ベポタスチン	10mg		
2	プレドニン	100mg	点滴静注または内服	エプキンリ投与30～120分前に
3	エプキンリ	48mg(1コース目の day1は0.16mg、day8は0.8mg)	皮下注	

1コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓							↓						
2	↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓			
3	↓							↓							↓							↓						

2～3コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																												
2																												
3	↓							↓							↓							↓						

4～9コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																												
2																												
3	↓														↓													

10コース目以降

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																												
2																												
3	↓																											

投与順序 1 コース目 day1,8,15,22: 1→2→3