

IsaKd療法(サークリサ+カイクロリス+デキサメタゾン)

適 応 疾 患 ： 再発・難治性の多発性骨髄腫

1コースの期間 ： 4 週間 上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	カロナール錠	500mg	内服	サークリサ投与15～60分前に内服
	ペポタスチンベシル酸塩OD錠	10mg		
	ファモチジンD錠	20mg		
3	デキサート	19.8mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	カイクロリス	20mg/m ² (1コース目 day1、2のみ)	点滴静注	30分
		56mg/m ²		
	注射用水	必要量 (カイクロリス10mgに対し5mLで溶解)		
	ブドウ糖液5%	100mL		
5	サークリサ	10mg/kg	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量(総量250mLとする)		

1コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
2	↓							↓							↓							↓						
3	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					
4	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
5	↓							↓							↓							↓						

2コース目以降

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
2	↓														↓													
3	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓	↓					
4	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
5	↓														↓													

投与順序 1 コース目の day1,8,15: 1→2→3→4→5 day2,9,16: 1→3→4
2 コース目以降の day1,15: 1→2→3→4→5 day2,8,9,16: 1→3→4