

Isa単剤療法

適 応 疾 患 ： 再発・難治性の多発性骨髄腫

1コースの期間 ： 4 週間 上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール錠	500mg	内服	サークリサ投与15～60分前に
	ベボタスチンベシル酸塩OD錠	10mg		
	ファモチジンD錠	20mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	ソル・メドロール静注用	100mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	生食	50mL	点滴静注	15分
5	サークリサ	20mg/kg	点滴静注	特記事項参照
	生食	必要量(総量250mLとする)		

1コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓							↓						
2	↓							↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓							↓						
4	↓							↓							↓							↓						
5	↓							↓							↓							↓						

2コース目以降

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓														↓													
2	↓														↓													
3	↓														↓													
4	↓														↓													
5	↓														↓													

投与順序 : 1→2→3→4→5