

DBd療法(ダラキューロ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン)

適 応 疾 患 : 多発性骨髄腫

1 コースの期間 : 1～8 コースは 3 週間、9 コース以降 4 週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール錠	400mg	内服	ダラキューロ投与1時間前に
	ベポタスチンベシル酸OD錠	10mg		
	キプレスOD錠	10mg		
2	レナデックス錠	20mg	内服	ダラキューロ投与1時間前に
3	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注射	
	生食	必要量		
4	ダラキューロ	15mL	皮下注射	3-5分

1～3コース目

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓							↓							↓						
2	↓	↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓			↓						
3	↓			↓				↓			↓										
4	↓							↓							↓						

4～8コース目

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓	↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓									
3	↓			↓				↓			↓										
4	↓																				

9コース目以降

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓																											
2	↓																											
3																												
4	↓																											

投与順序 1 、 2 → 3 → 4