

## Bd (皮下注)

適 応 疾 患 : 再発または難治性の多発性骨髄腫

1 コースの期間 : 3週間

| Rp. | 薬剤      | 投与量     | 投与経路 | 投与速度、時間          |
|-----|---------|---------|------|------------------|
| 1   | レナデックス錠 | 20mg    | 内服   | ボルテゾミブ投与日から2日間内服 |
| 2   | ボルテゾミブ  | 1.3mg/㎡ | 皮下注  |                  |
|     | 生食      | 必要量     |      |                  |

|     | day |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Rp. | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1   | ↓   | ↓ |   | ↓ | ↓ |   |   | ↓ | ↓ |    | ↓  | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ↓   |   |   | ↓ |   |   |   | ↓ |   |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

投与順序: day1、4、8、11 : 1→2