

DKd療法(ダラザレックス+カイプロリス+デキサメタゾン)

適 応 疾 患 :再発又は難治性の多発性骨髄腫

1 コースの期間 : 4 週間

上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	500mL/250mL	点滴静注	メインルート
2	カロナール錠	400mg	内服	抗がん剤投与1時間前に内服
	ベポタスチンベシル酸塩錠	10mg		
	キプレス錠	10mg		
3	デキサート注	19.8mg(day22は40mg)	点滴静注 (又は内服)	15分
	生食	50mL		
4	生食	50mL	点滴静注	30分(day22は60分)
5	カイプロリス	20mg/m ² (1コース目day1,2のみ)	点滴静注	30分
		56mg/m ²		
	注射用水	必要量		
	5%ブドウ糖液	100mL		
6	ダラザレックス	8mg/kg(1コース目day1,2のみ)	点滴静注	特記事項参照
		16mg/kg		
	生食	500mL		
7	メドロール錠	20mg	内服	朝昼食後

1コース

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
2	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
3	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
4	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
5	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
6	↓	↓						↓							↓							↓						
7			↓																									

2コース

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
2	↓							↓	↓						↓	↓						↓						
3	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
4	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
5	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
6	↓							↓							↓							↓						

3～6コース

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
2	↓							↓	↓						↓	↓												
3	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
4	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
5	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
6	↓							↓							↓													

7コース以降

Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
2	↓							↓	↓						↓	↓												
3	↓	↓						↓	↓						↓	↓						↓						
4	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
5	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
6	↓							↓							↓													

投与順序

カイプロリス+ダラザレックス投与日: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

カイプロリスのみ投与日: 1 → 3 → 4 → 5

ダラザレックスのみ投与日: 1 → 2 → 3 → 4 → 6