

DPd療法(ダラキューロ+ポマリスト+デキサメタゾン)

適応疾患 : 多発性骨髄腫

1コースの期間 : 4週間

上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	カロナール錠	400mg	内服	ダラキューロ投与1時間前に
	ベポタスチンベシル酸OD錠	10mg		
	キプレスOD錠	10mg		
2	レナデックス錠	40mg	内服	ダラキューロ投与1時間前に
		(75歳以上は20mgに減量)		
3	ダラキューロ	15mL	皮下注射	3-5分
4	ポマリストカプセル	4mg/day	内服	

1-2コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓								↓					
2	↓							↓							↓								↓					
3	↓							↓							↓								↓					
4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

3-6コース目

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓														↓													
2	↓							↓							↓								↓					
3	↓														↓													
4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

7コース目以降

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓																											
2	↓							↓							↓								↓					
3	↓																											
4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

投与順序 1 → 2 → 3 → 4

投与基準

<減量・休薬基準>

ダラキューロ:

Grade3 のinfusion reactionが3回発現した場合は本剤の投与を中止すること。

Grade4 のinfusion reactionが発現した場合は本剤の投与を中止すること。

ポマリスト:

血小板減少: 血小板数25000/μL未満に減少; 50000/μL以上に回復するまで本剤を休薬し、再開は休薬前の投与量から1mg減量すること。再開した後に再び発現した場合も同様とし、1mgに減量した後に再び副作用が発現した場合には、本剤の投与を中止すること。

好中球減少: 好中球数500/μL未満に減少又は発熱性好中球減少症(好中球数が1000/μL未満でかつ1回でも38.3°Cを超える発熱又は好中球数が1000/μL未満でかつ1時間を超えて持続する38°C以上の発熱); 1000/μL以上に回復するまで本剤を休薬し、再開は休薬前の投与量から1mg減量すること。再開した後に再び発現した場合も同様とし、1mgに減量した後に再び副作用が発現した場合には、本剤の投与を中止すること。

皮疹:Grade3の皮疹;Grade1以下に回復するまで本剤を休薬し、再開は休薬前の投与量から1mg減量すること(なお再開は、患者の状態に応じて判断すること)、再開した後に再び発現した場合も同様とし、1mgに減量した後に再び副作用が発現した場合には、本剤の投与を中止すること。

Grade4の皮疹又は水疱形成;本剤の投与を中止すること。

前記以外のGrade3の副作用又はGrade4の副作用;Grade2以下に回復するまで本剤を休薬し、再開は休薬前の投与量から1mg減量すること。再開した後に再び発現した場合も同様とし、1mgに減量した後に再び副作用が発現した場合には、本剤の投与を中止すること。

参考文献

Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in previously treated multiple myeloma (APOLLO) : an open-label, randomised, phase 3 trial. Meletios A Dimopoulos et al, Lancet Oncol 2021;22:801-12