

DCyBorD 療法(ダラキューロ+エンドキサン+ボルテゾミブ+デキサメタゾン)

適応疾患 :AL アミロイドーシス

1 コースの期間 : 4 週間 上限コース回数 : 24 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	カロナール	400mg	内服	ダラキューロ投与1時間前
	ペポタスチンベシル酸塩OD錠	10mg		
	キプレスOD錠	10mg		
3	デカドロン錠	20mg	内服	
4	デキサート	19.8mg	点滴静注	15分
		39.6mg(3-6コース目 day8,22のみ)		
	グラニセトロン	3mg		
	生食	50mL		
5	生食	50mL	点滴静注	60分
6	ダラキューロ	15mL	皮下注射	3-5分
7	エンドキサン	300mg/m ² (最大500mg)	点滴静注	60分
	生食	100mL		
8	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注射	
	生食	必要量		

1-2コース目

Rp.	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓								↓							↓							↓						
2	↓								↓							↓							↓						
3		↓								↓							↓							↓					
4	↓								↓							↓							↓						
5	↓								↓							↓							↓						
6	↓								↓							↓							↓						
7	↓								↓							↓							↓						
8	↓								↓							↓							↓						

3-6コース目

Rp.	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓								↓							↓							↓						
2	↓								↓							↓							↓						
3		↓															↓												
4	↓								↓							↓							↓						
5	↓								↓							↓							↓						
6	↓								↓							↓							↓						
7	↓								↓							↓							↓						
8	↓								↓							↓							↓						

7コース目以降

Rp.	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																													
2	↓																												
3	↓																												
4																													
5																													
6	↓																												
7																													
8																													

投与順序 1-2 コース目の day1,8,15,22: 1→2→4→5→6→7→8
 3-6 コース目の day1,15: 1→2→4→5→6→7→8 day8,22: 1→2→4→5→7→8
 7 コース目以降 day1: 2、3→6