

ビキセオス

適応疾患：高リスク急性骨髄性白血病

1コースの期間：2～8週間 ※寛解導入療法2コースする場合は1コース目のみ2～5週間

上限コース回数：寛解導入療法は2コース、地固め療法は2コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	中心静脈注射	メインルート
2	グラニセトロン	3mg	中心静脈注射	15分
	デキサート	9.9mg		
	生食	50mL		
3	ビキセオス	100ユニット/m ²	中心静脈注射	90分
	注射用水	必要量		
	生食	500mL		
4	ビキセオス	65ユニット/m ²	中心静脈注射	90分
	注射用水	必要量		
	生食	500mL		

寛解導入療法1コース目

Rp.	day													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓		↓		↓									
2	↓		↓											
3	↓		↓		↓									
4														

- ・寛解導入療法1コース目で寛解に到達せず忍容性が良好な場合、2～5週間後に寛解導入療法2コース目を行う。

寛解導入療法2コース目

Rp.	day																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	↓		↓																																			
2	↓		↓																																			
3	↓		↓																																			
4																																						

地固め療法

Rp.	day																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	↓		↓																																			
2	↓		↓																																			
3																																						
4	↓		↓																																			

投与順序 1→2→3、4

- ・最後の寛解導入療法から5～8週間後に地固め療法1コース目を開始する。
- ・地固め療法1コース目の投与開始後に病態が進行していない患者で忍容性が良好な場合に地固め療法2コース目を行う。