

ベスポンサ

適 応 疾 患 ： 再発・難治性 CD22 陽性の急性リンパ性白血病

1 コースの期間 1 コース目 : 3 週間 2 コース目以降 : 4 週間

上限コース回数 : 6 コース

★2 コース目以降
寛解、非寛解で day1 の
投与量が異なります。

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	解熱鎮痛剤 抗ヒスタミン剤		内服	ベスポンサ投与30分前
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	グラニセトロン	3mg	点滴静注	30分
	デキサート	9.9mg		
	生食	50mL		
4	ベスポンサ	day1 : 0.8mg/m ² (寛解時2～6コース : 0.5mg/m ²) day8、15 : 0.5mg/m ²	点滴静注	60分
	注射用水	必要量		
	生食	必要量(総量50mLとする)		

1 コース

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓							↓							↓						
2	↓							↓							↓						
3	↓							↓							↓						
4	↓							↓							↓						

2～6 コース

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓													
2	↓							↓							↓													
3	↓							↓							↓													
4	↓							↓							↓													

投与順序 1→2→3→4