

FP 療法(フルオロウラシル+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 頭頸部がん

1コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : 6 コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1 : 125mg day2、3 : 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
5	ソルデム1	500mL	点滴静注	60分
	硫酸Mg補正液	10mEq		
6	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
7	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	300mL		
8	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間
	生食	500mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓	↓																
3		↓	↓	↓	↓																
4	↓																				
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓	↓	↓	↓	↓																

投与順序 day1 : 1→2→4→5→6→7→8 day2～5 : 2→3→8