

アービタックス+シスプラチン+フルオロウラシル

適 応 疾 患 ： 頭頸部癌再発、転移、進行癌

1 コースの期間 ： 3 週間 上限コース回数 ： 6 回

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1 : 125mg day2、3 : 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL (day8,15は250mL)	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	ポラミン注	5mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	ポラミン注	5mg		
	生食	50mL		
6	アービタックス注	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注	初回120分 2回目以降60分
	生食	250mL		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
9	フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	24時間
	生食	500mL		

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓				↓							↓						
3	↓																				
4		↓	↓	↓																	
5								↓							↓						
6	↓							↓							↓						
7	↓																				
8	↓																				
9	↓	↓	↓	↓																	

投与順序 day1 : 1→2→3→6→7→8→9 day2～4 : 2→4→9 day8、15 : 2→5→6