

## CapeOX(カペシタビン+オキサリプラチン)

適応疾患：胃がん

1コースの期間：3週間

上限コース回数：治癒切除不能な進行・再発の場合：なし

術後補助化学療法の場合：8コース

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	5%ブドウ糖液	100mL		
4	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分
	5%ブドウ糖液	500mL		
5	カペシタビン		内服	朝夕食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

投与順序 1→2→3→4

### \*カペシタビン投与量(C法)

体表面積 1回量

1.96 m<sup>2</sup> ≤ 2100mg

1.66 m<sup>2</sup> ~ 1.96 m<sup>2</sup> 1800mg

1.36 m<sup>2</sup> ~ 1.66 m<sup>2</sup> 1500mg

1.36 m<sup>2</sup> > 1200mg

day 1 の夕食後から day 15 の朝食後の 14 日間服用する。