

# mFOLFOX6(フルオロウラシル+オキサリプラチン)

適応疾患：切除不能進行・再発胃がん

1コースの期間：2週間

上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アブレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	5%ブドウ糖液	100mL		
4	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分 レボホリナートと同時に投与
	5%ブドウ糖液	250mL		
5	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分 オキサリプラチンと同時に投与
	5%ブドウ糖液	250mL		
6	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分
	生食	50mL		
7	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	ポンプにて 持続静注	46時間
	ノボ・ヘパリン注	1mL		
	生食	必要量		
8	ヘパリンNaロック	100単位/10mL	点滴静注	化学療法終了後

Rp.	day													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	↓	↓	↓											
2	↓													
3	↓													
4	↓													
5	↓													
6	↓													
7	←→													
8			↓											

投与順序 1→2→3→4、5→6→7→8