SOX（S-1+オキサリプラチン） ＋オプジーボ

適 応 疾 患 ： HER2 陰性切除不能進行再発胃癌

1 コースの期間 ： 3 週間　　上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前
		day2、3：80mg		午前中
2	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	メインルート
3	オプジーボ	360mg/body	点滴静注	30分
	5%ブドウ糖液	100mL		
4	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	5%ブドウ糖液	100mL		
5	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分
	5%ブドウ糖液	500mL		
6	S-1	80mg/㎡/day	内服	朝夕食後

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓																				
3	↓																				
4	↓																				
5	↓																				
6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

投与順序　1→2→3→4→5