

SP(シスプラチン+S-1)

適応疾患：胃がん（手術不能または再発）

1コースの期間：5週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3:80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
5	S-1		内服	朝夕食後
6	デカドロン錠	8mg	内服	朝昼食後

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1								↓	↓	↓																		
2								↓																				
3								↓																				
4								↓																				
5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
6									↓	↓	↓																	

	day						
Rp.	29	30	31	32	33	34	35
1							
2							
3							
4							
5							
6							

投与順序 1→2→3→4