

XP(カペシタビン+シスプラチン)

適応疾患：切除不能・再発胃がん

1コースの期間：3週間 上限コース回数：なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	500mL	点滴静注	メインルート
2	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
3	パロノセトン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	120分
	生食	500mL		
5	カペシタビン		内服	朝夕食後
6	デカドロン錠	8mg	内服	朝昼食後

Rp.	day																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓																				
2	↓	↓	↓																		
3	↓																				
4	↓																				
5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
6		↓	↓	↓																	

投与順序 1→2→3→4

*カペシタビン投与量(C法)

体表面積 1回量

1.96 m² ≤ 2100mg

1.66 m² ~ 1.96 m² 1800mg

1.36 m² ~ 1.66 m² 1500mg

1.36 m² > 1200mg

day 1 の夕食後から day 15 の朝食後の 14 日間服用する。