

サイラムザ+Weekly パクリタキセル

適 応 疾 患 : 治癒切除不能な進行胃癌・治癒切除不能な再発胃癌

1コースの期間 : 4週間

上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	レスタミンコーワ錠	5錠(50mg)	内服	day1、15:サイラムザ投与30分前までに day8:パクリタキセル投与30分前までに
3	デキサート注 ファモチジン注	8.25mg 20mg	静注	day1、15:緩徐に静注 day8:パクリタキセル投与約30分
4	生食	50mL	点滴静注	30分
5	サイラムザ 生食	8mg/kg 250mL	点滴静注	30分~60分
6	生食	100mL	点滴静注	60分(サイラムザ投与後のブランク、3コース目からは省略可能)
7	パクリタキセル 生食	80mg/m ² 250mL	点滴静注	60分

Rp.	day																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓						↓								↓													
2	↓						↓								↓													
3	↓						↓								↓													
4							↓																					
5	↓														↓													
6	↓														↓													
7	↓						↓								↓													

投与順序 day1、15:1→2→3→5→6→7 day8:1→2→3→4→7