サイラムザ+Weekly パクリタキセル

適 応 疾 患 ： 治癒切除不能な進行胃癌・治癒切除不能な再発胃癌

1コースの期間 ： 4週間　　上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	生食	250mL	点滴静注	メインルート
2	レスタミンコーワ錠	5錠（50mg）	内服	day1、15：サイラムザ投与30分前までに day8：パクリタキセル投与30分前までに
3	デキサート注	8.25mg	静注	day1、15：緩徐に静注 day8：パクリタキセル投与約30分
	ファモチジン注	20mg		
4	生食	50mL	点滴静注	30分
5	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注	30分～60分
	生食	250mL		
6	生食	100mL	点滴静注	60分（サイラムザ投与後のブランク、3コース目からは省略可能）
7	パクリタキセル	80mg/㎡	点滴静注	60分
	生食	250mL		

＼	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓							↓							↓													
2	↓							↓							↓													
3	↓							↓							↓													
4								↓																				
5	↓														↓													
6	↓														↓													
7	↓							↓							↓													

投与順序　day1、15：1→2→3→5→6→7　day8：1→2→3→4→7