FP（フルオロウラシル+シスプラチン）

適 応 疾 患 ： 食道がん

1コースの期間 ： 4～6 週間　　上限コース回数 ： なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1：125mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
		day2、3：80mg		
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	シスプラチン	70～80mg/㎡	点滴静注	90分
	生食	500mL		
6	フルオロウラシル	700～800mg/㎡	点滴静注	24時間
	生食	500mL		

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓	↓	↓	↓	↓																							
3	↓																											
4		↓	↓	↓	↓																							
5	↓																											
6	↓	↓	↓	↓	↓																							

投与順序　day1：1→2→3→5→6　day2-5：2→4→6