

オブジーボ+FP(フルオロウラシル+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 根治切除不能な進行・再発の食道癌

1コースの期間 : 4週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1:125mg day2、3:80mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
2	生食	500mL/250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	オブジーボ	240mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
6	硫酸Mg補正液	8mEq	点滴静注	240分
	生食	1L		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	90分
	生食	500mL		
9	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間
	生食	500mL		
10	生食	1L	点滴静注	240分

	day																											
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	↓	↓	↓																									
2	↓	↓	↓	↓	↓										↓													
3	↓																											
4		↓	↓	↓	↓																							
5	↓														↓													
6	↓																											
7	↓																											
8	↓																											
9	↓	↓	↓	↓	↓																							
10	↓																											

投与順序 day1: 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10、 day2-5: 2 → 4 → 9、 day15: 2 → 5