

キイトルーダ+ FP(フルオロウラシル+シスプラチン)

適 応 疾 患 : 根治切除不能な進行・再発の食道癌

1 コースの期間 : 3 週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg day2、3: 80mg	内服	抗がん剤投与60～90分前 午前中
2	生食	500mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	9.9mg		
	生食	50mL		
4	デキサート注	6.6mg	点滴静注	15分
	生食	50mL		
5	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注	30分
	生食	100mL		
6	硫酸Mg補正液	8mEq	点滴静注	240分
	生食	1L		
7	マンニトール注	300mL	点滴静注	30分
8	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	90分
	生食	500mL		
9	フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間
	生食	500mL		
10	生食	1L	点滴静注	240分

	day																				
Rp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	↓	↓	↓																		
2	↓	↓	↓	↓	↓																
3	↓																				
4		↓	↓	↓	↓																
5	↓																				
6	↓																				
7	↓																				
8	↓																				
9	↓	↓	↓	↓	↓																
10	↓																				

投与順序 day1: 1→2→3→5→6→7→8→9→10 day2-5: 2→4→9