

## CapelRI(イリノテカン+カペシタビン)

適 応 疾 患 : 切除不能進行再発大腸がん

1コースの期間 : 3週間 上限コース回数 : なし

Rp.	薬剤	投与量	投与経路	投与速度、時間
1	アプレピタントカプセル	day1: 125mg	内服	抗がん剤投与60~90分前 午前中
		day2、3: 80mg		
2	生食	250mL	点滴静注	メインルート
3	パロノセトロン静注	0.75mg	点滴静注	15分
	デキサート注	4.95mg		
	生食	50mL		
4	イリノテカン	100~200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分
	5%ブドウ糖液	250mL		
5	カペシタビン	1600mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後

投与順序 1→2→3→4

\*カペシタビン用量(AXEPT 試験での用量設定より)

体表面積	カペシタビン1回用量 (mg)		
	導入用量	1段階減量	2段階減量
~<1.26	900	600	600
1.26 ≤ ~<1.31		900	
1.31 ≤ ~<1.69	1200		
1.69 ≤ ~<1.76	1500	1200	
1.76 ≤ ~<1.88			
1.88 ≤ ~<2.07	1800	1500	900
2.07 ≤ ~<2.26			
2.26 ≤ ~			

カペシタビンは day1 の夕食後から開始し、day15 の朝食後まで内服。